

1. ¿Cuál es el sitio de acantonamiento característico de los virus del herpes simple durante su periodo de latencia?

A) Queratinocitos basales

B) Ganglios sensitivos

C) Células del sistema retículo-endotelial

D) Tejido linfoide orofaríngeo

RESPUESTA:

B) Ganglios sensitivos

2. En la epidemiología del virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2), ¿qué factor se considera clave para su propagación actual?

- A) El reservorio en animales domésticos
- B) La inmunidad natural de la población adulta
- C) La excreción viral asintomática
- D) La transmisión exclusiva por fómites

RESPUESTA:

C) La excreción viral asintomática

3. ¿Qué complicación cutánea severa por el virus del herpes simple suele afectar a niños con dermatitis atópica?

- A) Herpes gladiatorum
- B) Gingivoestomatitis herpética
- C) Erupción varioliforme de Kaposi
- D) Panadizo herpético

RESPUESTA:

C) Erupción varioliforme de Kaposi

4. ¿Cuál es el tratamiento de elección para una primoinfección por herpes simple según las pautas de tratamiento oral?

- A) Penicilina benzatina en dosis única
- B) Aciclovir 400 mg cada 8 horas durante 10 días
- C) Brivudina 125 mg al día durante 7 días
- D) Aciclovir tópico al 5% cada 4 horas

RESPUESTA:

B) Aciclovir 400 mg cada 8 horas durante 10 días

5. ¿Qué virus es el responsable de causar la leucoplasia oral vellosa en pacientes inmunodeprimidos o con VIH?

- A) Virus del Papiloma Humano (VPH)
- B) Virus de Epstein-Barr (VHH-4)
- C) Herpesvirus humano tipo 8 (VHH-8)
- D) Citomegalovirus (VHH-5)

RESPUESTA:

B) Virus de Epstein-Barr (VHH-4)

6. En el contexto de la varicela, ¿a qué se refiere el término clínico "aspecto de cielo estrellado"?

- A) A la disposición de las vesículas siguiendo una metámera nerviosa
- B) A la aparición de vesículas únicamente en el cuero cabelludo
- C) A la presencia de lesiones en diferentes estadios evolutivos simultáneamente
- D) Al color blanquecino de las pústulas tras la sobreinfección bacteriana

RESPUESTA:

C) A la presencia de lesiones en diferentes estadios evolutivos simultáneamente

7. ¿Cuál es la complicación tardía más frecuente del Herpes Zóster, definida por la persistencia del dolor más de 3 meses tras la erupción?

- A) Síndrome de Gianotti-Crosti
- B) Neuralgia postherpética
- C) Queratoconjuntivitis herpética
- D) Herpes zóster generalizado

RESPUESTA:

B) Neuralgia postherpética

8. ¿Dentro de qué ventana de tiempo es ideal iniciar el tratamiento antiviral en un Herpes Zóster para minimizar complicaciones?

- A) Antes de las 72 horas del inicio de las lesiones
- B) Únicamente si aparece fiebre superior a 38°C
- C) Solo cuando las vesículas se vuelven purulentas
- D) En los primeros 10 días tras la aparición de costras

RESPUESTA:

A) Antes de las 72 horas del inicio de las lesiones

9. ¿Qué genotipos del Virus del Papiloma Humano (VPH) tienen un alto potencial carcinogénico?

A) 3 y 10

B) 6 y 11

C) 1 y 2

D) 16 y 18

RESPUESTA:

D) 16 y 18

10. ¿Cuál es la morfología típica de las lesiones por molusco contagioso?

- A) Nódulos rojo-violáceos dolorosos
- B) Pápulas cupuliformes umbilicadas
- C) Vesículas agrupadas en racimo sobre base eritematosa
- D) Placas verrugosas con puntos negros en su superficie

RESPUESTA:

B) Pápulas cupuliformes umbilicadas

11. Respecto a la transmisión del molusco contagioso, ¿cuál de las siguientes opciones representa un factor de riesgo común en adultos?

- A) Enfermedad de transmisión sexual (ETS)
- B) Inhalación de gotitas de saliva en suspensión
- C) Consumo de lácteos no pasteurizados
- D) Mordedura de insectos vectores

RESPUESTA:

A) Enfermedad de transmisión sexual (ETS)

12. ¿Qué enfermedad vírica se caracteriza por una erupción simétrica en zonas acrales como cara, nalgas y extremidades?

A) ORF (Ectima contagioso)

B) Pitiriasis rosada de Gibert

C) Síndrome de Gianotti-Crosti

D) Herpangina

RESPUESTA:

C) Síndrome de Gianotti-Crosti

13. ¿Cuál es el reservorio y mecanismo de contagio principal del virus ORF (Ectima contagioso)?

- A) Ovejas y corderos infectados; contacto directo con pastores o veterinarios
- B) El hombre es el único reservorio; transmisión por vía aérea
- C) Agua de piscinas climatizadas; autoinoculación
- D) Vacas lecheras; contagio durante el ordeño

RESPUESTA:

A) Ovejas y corderos infectados; contacto directo con pastores o veterinarios

14. ¿Cuál es el tratamiento tópico indicado para el manejo de las verrugas planas?

A) Cantaridina al 0,7%

B) Aciclovir tópico al 5%

C) Tretinoína al 0,1%

D) Podofilotoxina al 0,5%

RESPUESTA:

C) Tretinoína al 0,1%

15. En el Herpes Zóster oftálmico, ¿qué signo clínico indica un alto riesgo de afectación ocular?

- A) Presencia de vesículas en el conducto auditivo externo
- B) Afectación de la rama nasociliar del trigémino
- C) Dolor intenso en la región mandibular
- D) Desarrollo de costras purulentas en la frente

RESPUESTA:

B) Afectación de la rama nasociliar del trigémino