

1. ¿Qué le sucede al macho de *Sarcoptes scabiei* inmediatamente después de la cópula en la superficie de la piel?

A) Excava un túnel subcórneo

B) Se transforma en ninfa

C) Muere

D) Migra a la ropa del huésped

RESPUESTA:

C) Muere

2. ¿Cuál es el vector biológico responsable de la transmisión del tifus exantemático (*Rickettsia prowazekii*)?

A) *Pediculus humanus* var. *capitis*

B) *Sarcoptes scabiei*

C) *Pediculus humanus* var. *corporis*

D) *Phthirus pubis*

RESPUESTA:

C) *Pediculus humanus var. corporis*

3. ¿Qué nombre reciben las manchas azuladas producidas por la saliva de Phtiruspubis al actuar sobre la hemoglobina del huésped?

A) Mancha negra (tache noir)

B) Máculas cerúleas

C) Plica polonesa

D) Vesículas perladas

RESPUESTA:

B) Máculas cerúleas

4. ¿Cuál es la pauta recomendada para la aplicación de Permetrina al 5% en el tratamiento de la sarna?

- A) Tres aplicaciones en el mismo día
- B) Dos aplicaciones separadas por una semana
- C) Una aplicación diaria durante un mes
- D) Una aplicación única sin repetición

RESPUESTA:

B) Dos aplicaciones separadas por una semana

5. ¿Qué variante de la sarna se caracteriza por la presencia de millones de ácaros y placas hiperqueratósicas en pacientes inmunodeprimidos?

A) Sarna clásica

B) Sarna de los cereales

C) Sarna noruega (costrosa)

D) Sarna nodular

RESPUESTA:

C) Sarna noruega (costrosa)

6. ¿Cuál es el signo clínico inicial y patognomónico de la enfermedad de Lyme?

A) Larva currens

B) Oftalmia nudosa

C) Exantema palmo-plantar

D) Eritema migratorio

RESPUESTA:

D) Eritema migratorio

7. ¿Qué componente del veneno de la araña reclusa marrón (*Loxoscelesreclusa*) desencadena la necrosis tisular?

A) Hialuronidasa

B) Esfingomielinasa D

C) Alfa-latrotóxina

D) Acetilcolina

RESPUESTA:

B) Esfingomielinasa D

8. ¿Cuál es la lesión elemental típica del prurigo agudo o urticaria papulosa en niños?

A) Escara necrótica

B) Nódulo de milker

C) Surco acarino

D) Seropápula de Tommasoli

RESPUESTA:

D) Seropápula de Tommasoli

9. ¿Cuánto tiempo sobrevive aproximadamente el ácaro de la sarna fuera del huésped humano en condiciones normales?

A) 7 días

B) 2-3 días

C) 30 días

D) 2 horas

RESPUESTA:

B) 2-3 días

10. ¿A qué temperatura se considera que mueren los piojos del género *Pediculus*?

A) Solo por encima de los 60°C

B) Mayor a 40°C

C) A los 20°C

D) A los 37°C

RESPUESTA:

B) Mayor a 40° C

11. ¿Cuál es la técnica recomendada para la extracción de larvas en el caso de la miasis forunculoide?

- A) Incisión y drenaje inmediato
- B) Aplicación de calor local intenso
- C) Uso de pinzas de punta fina sin preparación
- D) Oclusión con vaselina o parafina

RESPUESTA:

D) Oclusión con vaselina o parafina

12. ¿Qué hallazgo histológico es característico del 'Botón de Oriente' en la Leishmaniasis?

- A) Escíbalos de ácaro
- B) Signo del ala delta
- C) Cuerpos de Leishman-Donovan
- D) Infiltrado de neutrófilos masivo

RESPUESTA:

C) Cuerpos de Leishman-Donovan