

1. ¿Qué porcentaje de cabellos se encuentra normalmente en la fase anágena o de crecimiento?

A) 1%

B) 50%

C) 85%

D) 14%

RESPUESTA:

C) 85%

2. En la alopecia androgenética, el proceso fisiológico fundamental que sufren los folículos pilosos es:

- A) La miniaturización progresiva
- B) Una inflamación aguda del bulbo
- C) La ausencia congénita de folículos
- D) La destrucción por fibrosis

RESPUESTA:

A) La miniaturización progresiva

3. ¿Cuál es la dosis oral diaria recomendada de Finasteride para varones con alopecia androgenética?

A) 1 mg

B) 2 mg

C) 0,5 mg

D) 5 mg

RESPUESTA:

C) 0,5 mg

4. El patrón típico de la alopecia androgenética masculina (escala de Hamilton) comienza con una recesión del cabello en:

- A) La zona parietooccipital únicamente
- B) La nuca y los laterales
- C) La línea frontoparietal (entradas) y el vértex (coronilla)
- D) Un aclaramiento difuso por toda la cabeza

RESPUESTA:

C) La línea frontoparietal (entradas) y el vértex (coronilla)

5. De los siguientes, ¿cuál es el principal agente hormonal implicado en la alopecia androgenética, siendo un metabolito activo de la testosterona?

A) DHT (Dihidrotestosterona)

B) Andrógenos en general

C) Estrógenos

D) Testosterona

RESPUESTA:

A) DHT (Dihidrotestosterona)

6. ¿Qué porcentaje de hombres de entre 40 y 50 años presenta alopecia androgenética?

A) 50%

B) 30%

C) 40%

D) 25%

RESPUESTA:

C) 40%

7. ¿En qué categoría de eficacia se encuentran el masaje capilar y ciertas vitaminas?

A) Tratamientos adyuvantes

B) Con eficacia probada

C) Con eficacia moderada

D) Con eficacia dudosa

RESPUESTA:

D) Con eficacia dudosa

8. ¿Qué fármaco, debido a su larga vida media de 5 semanas, requiere que el paciente no done sangre hasta 6 meses después de suspenderlo?

A) Finasteride

B) Espironolactona

C) Dutasteride

D) Minoxidil

RESPUESTA:

C) Dutasteride

9. En el tratamiento tópico de la alopecia, ¿cuánto tiempo debe permanecer el Minoxidil en contacto con el cuero cabelludo antes de lavarlo para ser eficaz?

A) No se puede lavar hasta pasadas 24 horas

B) Al menos 4 horas

C) 1 hora

D) Debe dejarse actuar toda la noche

RESPUESTA:

B) Al menos 4 horas

10. ¿Qué ocurre si un paciente suspende el tratamiento con Minoxidil?

- A) Una caída del cabello a los 3-6 meses
- B) Una reacción alérgica severa
- C) Un aumento de la pilosidad corporal
- D) No ocurre nada, el pelo ganado se mantiene

RESPUESTA:

A) Una caída del cabello a los 3-6 meses