

1. ¿Qué hallazgo clínico es característico al realizar la compresión lateral de un dermatofibroma?

A) Signo de Nikolsky

B) Signo de Darier

C) Signo de Auspitz

D) Signo del hoyuelo

RESPUESTA:

D) Signo del hoyuelo

2. ¿Cuál es la asociación estratégica más importante del Signo de Leser-Trélat?

- A) Diabetes mellitus tipo 2
- B) Adenocarcinoma de estómago o mama
- C) Insuficiencia renal crónica
- D) Infección por el virus del papiloma humano

RESPUESTA:

B) Adenocarcinoma de estómago o mama

3. ¿Qué tumor de los anejos cutáneos se presenta típicamente como un nódulo pétreo en niños y muestra células fantasma en la histología?

A) Tracoeptelioma

B) Pilomatricoma

C) Espiroadenoma ecrino

D) Cilindroma

RESPUESTA:

B) Pilomatricoma

4. Desde el punto de vista biológico, ¿qué diferencia fundamental existe entre un hemangioma infantil y una malformación vascular?

- A) Los hemangiomas son hamartomas que nunca responden a fármacos
- B) La malformación vascular crece rápidamente en los primeros meses de vida
- C) El hemangioma tiene capacidad proliferativa propia y puede involucionar
- D) Las malformaciones vasculares siempre involucionan antes de la pubertad

RESPUESTA:

C) El hemangioma tiene capacidad proliferativa propia y puede involucionar

5. ¿Cuál es la causa principal de la necrosis dolorosa en un fibroma blando o acrocordón?

- A) Infección bacteriana secundaria
- B) Torsión del pedículo
- C) Transformación a carcinoma escamoso
- D) Acumulación excesiva de queratina

RESPUESTA:

B) Torsión del pedículo

6. ¿En qué patología sistémica es característica la presencia de angiofibromas faciales?

A) Síndrome de Gorlin

B) Síndrome de Cowden

C) Enfermedad de von Recklinghausen

D) Esclerosis tuberosa

RESPUESTA:

D) Esclerosis tuberosa

7. ¿Qué característica clínica define a la variante adquirida del nevus epidérmico conocida como NEVIL?

- A) Asociación exclusiva con tumores viscerales
- B) Crecimiento rápido durante el embarazo
- C) Presencia de inflamación, picor o dolor
- D) Ausencia total de queratinización

RESPUESTA:

C) Presencia de inflamación, picor o dolor

8. ¿Cuál es la sospecha principal ante un tumor cutáneo que presenta dolor intenso, ya sea espontáneo o provocado?

A) Espiroadenoma ecrino

B) Hemangioma infantil

C) Queratosis seborreica

D) Dermatofibroma

RESPUESTA:

A) Espiroadenoma ecrino

9. ¿Qué hallazgo histológico es típico de la queratosis seborreica?

A) Lóbulos basófilos con cápsula conjuntiva

B) Quistes de queratina intraepidérmicos

C) Presencia de células poroides ricas en glucógeno

D) Proliferación de células endoteliales

RESPUESTA:

B) Quistes de queratina intraepidérmicos

10. Los fibromas blandos múltiples se han asociado clínicamente con:

- A) Déficit de vitamina D
- B) Síndrome metabólico y acantosis nigricans
- C) Exposición crónica a radiación ultravioleta
- D) Uso prolongado de antibióticos sistémicos

RESPUESTA:

B) Síndrome metabólico y acantosis nigricans

11. ¿Cómo se clasifican los tumores vasculares que son errores en la morfogénesis de los vasos y están presentes desde el nacimiento?

- A) Angiomas eruptivos
- B) Hemangiomas benignos
- C) Malformaciones vasculares
- D) Epiteliomas primordiales

RESPUESTA:

C) Malformaciones vasculares

12. ¿Cuál es la localización más frecuente de un dermatofibroma?

A) Extremidades inferiores

B) Región periorbitaria

C) Mucosa oral

D) Cuero cabelludo

RESPUESTA:

A) Extremidades inferiores

13. ¿Qué técnica diagnóstica permite diferenciar una queratosis seborreica mediante la observación de un patrón vascular en horquilla?

A) Dermatoscopia

B) Prueba de Tzanck

C) Luz de Wood

D) Biopsia por punción

RESPUESTA:

A) Dermatoscopia

14. ¿Qué estructura se interrumpe durante la torsión de un fibroma blando?

- A) Conducto excretor sebáceo
- B) Aporte vascular
- C) Inervación sensorial
- D) Drenaje linfático solamente

RESPUESTA:

B) Aporte vascular

15. ¿Qué tipo de diferenciación glandular presenta el siringoma?

A) Apocrina

B) Ecrina

C) Folicular

D) Sebácea

RESPUESTA:

B) Ecrina

16. En el contexto de las anomalías vasculares, los tumores que responden a fármacos antiangiogénicos son:

A) Linfangiomas

B) Hemangiomas

C) Manchas en vino de Oporto

D) Telangiectasias

RESPUESTA:

B) Hemangiomas

17. ¿Cuál es la denominación alternativa para la queratosis seborreica?

- A) Verruga vulgar
- B) Nevus de Sutton
- C) Verruga senil
- D) Acrocordón

RESPUESTA:

C) Verruga senil

18. Un nódulo intradérmico con una rica red de fibrillas nerviosas en el estroma es la definición histológica de:

- A) Espiroadenoma ecrino
- B) Neuroma plexiforme
- C) Leiomioma
- D) Dermatofibroma

RESPUESTA:

A) Espiroadenoma ecrino

19. ¿Qué variante de la queratosis seborreica se asocia con el folículo piloso?

A) Queratosis acantótica

B) Dermatitis papulosa nigra

C) Queratosis folicular invertida

D) Queratosis adenoide

RESPUESTA:

C) Queratosis folicular invertida

20. ¿Cuál es la morfología típica de un fibroma blando o acrocordón?

- A) Nódulo pétreo subcutáneo
- B) Placa verrugosa lineal
- C) Tumor pediculado y piriforme
- D) Mácula pigmentada de bordes irregulares

RESPUESTA:

C) Tumor pediculado y piriforme

21. En la clasificación de tumores de anejos, un 'epitelioma primordial' se caracteriza por:

- A) Presencia de conductos excretores perfectos
- B) Origen exclusivo en la hipodermis
- C) Diferenciación mínima o ausente
- D) Alta tasa de metástasis linfática

RESPUESTA:

C) Diferenciación mínima o ausente

22. ¿Qué síntoma suele acompañar a la aparición eruptiva de fibromas blandos durante el embarazo?

- A) Aparición progresiva sin otros síntomas
- B) Prurito intenso generalizado
- C) Fiebre y malestar general
- D) Sangrado espontáneo frecuente

RESPUESTA:

A) Aparición progresiva sin otros síntomas

23. ¿Qué componente del tejido conjuntivo se encuentra en exceso en un dermatofibroma?

A) Tejido adiposo

B) Colágeno

C) Elastina

D) Mucina

RESPUESTA:

B) Colágeno

24. El nevus epidérmico lineal suele ser:

A) Congénito

B) Altamente contagioso

C) Causado por radiación

D) Exclusivo de la edad adulta

RESPUESTA:

A) Congénito

25. Un tumor vascular que presenta involución en los primeros años de vida se denomina:

A) Angioma senil

B) Malformación arteriovenosa

C) Glangioma

D) Hemangioma

RESPUESTA:

D) Hemangioma

26. ¿Qué síntoma dermatológico define al Signo de Leser-Trélat?

A) Prurito

B) Sangrado profuso

C) Anestesia local

D) Fotosensibilidad

RESPUESTA:

A) Prurito

27. ¿En qué áreas corporales son más frecuentes los fibromas blandos?

A) Región pretibial

B) Palmas y plantas

C) Cuello, axilas e ingles

D) Espalda y abdomen únicamente

RESPUESTA:

C) Cuello, axilas e ingles