

2. ¿Qué fase de la evolución de un eczema agudo se caracteriza por la aparición de pequeñas ampollas llenas de líquido?

A) Fase vesiculosa

B) Fase costrosa

C) Fase secretante

D) Fase eritematosa

RESPUESTA:

A) Fase vesiculosa

3. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el eczema de contacto irritativo y el alérgico?

- A) El eczema irritativo requiere una sensibilización previa, mientras que el alérgico no.
- B) El eczema alérgico puede afectar a cualquier persona, mientras que el irritativo solo a personas predispuestas.
- C) El eczema alérgico es una reacción inmunológica (hipersensibilidad tipo IV), mientras que el irritativo es un daño directo a la piel.
- D) El eczema irritativo causa más prurito que el alérgico.

RESPUESTA:

C) El eczema alérgico es una reacción inmunológica (hipersensibilidad tipo IV), mientras que el irritativo es un daño directo a la piel.

4. ¿Cuál es la causa más frecuente de dermatitis de contacto en la población general?

A) La parafenilendiamina (PPD)

B) El cobalto

C) El níquel

D) El cromo

RESPUESTA:

C) El níquel

5. ¿Qué hallazgo histológico es característico de las formas agudas de eczema?

- A) Infiltrado de neutrófilos
- B) Acantosis y papilomatosis
- C) Espongiosis
- D) Hiperqueratosis

RESPUESTA:

C) Espongiosis

6. La dermatitis de contacto por cromo es la primera causa de incapacidad laboral. ¿En qué producto de uso profesional se encuentra principalmente este metal?

A) Resinas epoxi

B) Cemento

C) Pinturas y cerámicas

D) Tintes capilares

RESPUESTA:

B) Cemento

7. ¿Cuál es el tratamiento considerado fundamental o básico en el manejo de un eczema de contacto?

A) Eliminar la causa

B) Aplicación de fomentos con sulfato de cobre

C) Uso de antihistamínicos

D) Administración de corticoides orales

RESPUESTA:

A) Eliminar la causa

**8. El eczema numular se caracteriza por lesiones de una forma particular.
¿Cuál es esa forma?**

- A) Difusa y mal definida
- B) En forma de moneda
- C) Anular con centro claro
- D) Lineal

RESPUESTA:

B) En forma de moneda

9. ¿En qué localizaciones es más característico el eczema dishidrótico o ponfólíx?

A) Cuero cabelludo y cara

B) Pliegues de codos y rodillas

C) Tercio inferior de las piernas

D) Caras laterales de los dedos, palmas y plantas

RESPUESTA:

D) Caras laterales de los dedos, palmas y plantas

10. El eczema de estasis está asociado a una condición subyacente. ¿Cuál es?

- A) Estrés emocional
- B) Una reacción alérgica a medicamentos
- C) Una infección bacteriana
- D) Hipertensión venosa

RESPUESTA:

D) Hipertensión venosa

11. ¿Cuál es la profesión con mayor riesgo de desarrollar dermatitis de contacto alérgica por parafenilendiamina (PPD)?

A) Peluquería

B) Personal sanitario

C) Protésicos dentales

D) Personal de la construcción

RESPUESTA:

A) Peluquería

12. En el eczema de contacto alérgico, ¿qué célula es la responsable de captar el antígeno (hapteno-proteína) en la piel y presentarlo a los linfocitos T?

A) Queratinocito

B) Linfocito T de memoria

C) Mastocito

D) Célula de Langerhans

RESPUESTA:

D) Célula de Langerhans

13. ¿Qué porcentaje de la dermatitis de contacto profesional es de tipo irritativo?

A) 50%

B) 80%

C) 20%

D) 100%

RESPUESTA:

B) 80%

14. El tiomersal es un conservante que puede causar dermatitis de contacto. ¿En cuál de los siguientes productos es común encontrarlo?

- A) Tintes textiles de color oscuro
- B) Guantes de goma
- C) Soluciones para lentes de contacto y vacunas
- D) Cemento

RESPUESTA:

C) Soluciones para lentes de contacto y vacunas

15. En el eczema fotoinducido, ¿qué papel juega la radiación lumínica?

- A) Activa los linfocitos T de memoria directamente.
- B) Convierte una sustancia (hapteno) en un alérgeno activo.
- C) Causa un daño térmico directo en la piel.
- D) Destruye la barrera lipídica de la piel.

RESPUESTA:

B) Convierte una sustancia (hapteno) en un alérgeno activo.

16. La alergia al cobalto raramente se presenta de forma aislada. ¿Con qué otras dos alergias a metales suele estar asociada?

A) Aluminio y yodo

B) Níquel y cromo

C) Oro y mercurio

D) Plata y platino

RESPUESTA:

B) Níquel y cromo

17. ¿Cuál es la fase final en la secuencia evolutiva de un eczema, caracterizada por el desprendimiento de la capa superficial de la piel?

A) Fase costrosa

B) Fase vesiculosa

C) Fase descamativa

D) Fase secretante

RESPUESTA:

C) Fase descamativa

18. ¿Qué signo clínico es distintivo de un eczema en su forma crónica?

- A) Exudación y costras
- B) Edema y vesiculación
- C) Eritema brillante y aparición de pústulas
- D) Engrosamiento y liquenificación

RESPUESTA:

D) Engrosamiento y liquenificación

19. ¿Qué tipo de prueba diagnóstica se utiliza para confirmar la causa de una dermatitis alérgica de contacto?

A) Biopsia de piel

B) Prick-test

C) Prueba del parche (Patch-test)

D) Análisis de sangre para IgE específica

RESPUESTA:

C) Prueba del parche (Patch-test)

20. La dermatitis de contacto en los párpados puede ser causada por productos que no se aplican directamente en ellos. ¿Cuál de las siguientes es una causa común de eczema palpebral?

A) Calzado de piel

B) Dentríficos

C) Desodorantes

D) Laca de uñas

RESPUESTA:

D) Laca de uñas

21. En el contexto del eczema alérgico de contacto, ¿qué es un hapteno?

- A) Una célula presentadora de antígenos.
- B) Un tipo de linfocito T responsable de la reacción cutánea.
- C) Una molécula pequeña que se vuelve alergénica al unirse a una proteína de la piel.
- D) Una proteína de la piel que causa la reacción alérgica.

RESPUESTA:

C) Una molécula pequeña que se vuelve alergénica al unirse a una proteína de la piel.

22. ¿Qué factor se postula como un desencadenante importante del eczema dishidrótico, aunque su causa exacta sea desconocida?

A) Contacto con el cemento

B) Exposición al frío seco

C) Estrés

D) Hipertensión venosa

RESPUESTA:

C) Estrés

23. ¿Cuál es la localización más frecuente de los eczemas en general?

A) La cara

B) Las manos

C) Las piernas

D) El tronco

RESPUESTA:

B) Las manos

24. ¿Qué periodo de tiempo aproximado tarda en desarrollarse la sensibilización en la dermatitis alérgica de contacto, desde la primera exposición al alérgeno?

A) Menos de 24 horas

B) 48 horas

C) Varios meses o años

D) 5-10 días hasta semanas

RESPUESTA:

D) 5-10 días hasta semanas

25. Además de los corticoides, ¿qué otro grupo de medicamentos tópicos se menciona para el tratamiento del eczema crónico de manos en asociación?

A) Antibióticos tópicos

B) Antihistamínicos tópicos

C) Retinoides tópicos

D) Inhibidores de la calcineurina (Tacrolimus o pimecrolimus)

RESPUESTA:

D) Inhibidores de la calcineurina (Tacrolimus o pimecrolimus)

26. ¿Cuál de las siguientes profesiones es mencionada como típicamente afectada por el eczema irritativo de manos?

A) Pintores

B) Jardineros

C) Oficinistas

D) Camareros y amas de casa

RESPUESTA:

D) Camareros y amas de casa

27. La alergia al cuero curtido del calzado o cinturones está generalmente causada por:

A) Látex

B) Cromo

C) Resinas

D) Níquel

RESPUESTA:

B) Cromo