

1. ¿Cuál es el síntoma subjetivo fundamental que caracteriza al liquen plano?

- A) Pápulas violáceas
- B) Dolor quemante
- C) Prurito intenso
- D) Sensación de calor

RESPUESTA:

C) Prurito intenso

2. En el liquen plano, la aparición de nuevas lesiones sobre áreas de piel que han sufrido un traumatismo o rascado se conoce como:

- A) Estrías de Wickham
- B) Fenómeno de Koebner
- C) Signo de Darier
- D) Cuerpos de Civatte

RESPUESTA:

B) Fenómeno de Koebner

3. ¿Qué variante de liquen plano oral presenta un mayor riesgo de transformación a carcinoma de células escamosas?

A) La forma en placa

B) La forma reticular

C) La forma erosiva

D) La forma ampollosa

RESPUESTA:

C) La forma erosiva

4. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histopatológicos es característico del liquen plano?

A) Células de Tzanck

B) Paraqueratosis confluyente

C) Microabscesos de Munro

D) Acantosis irregular en dientes de sierra

RESPUESTA:

D) Acantosis irregular en dientes de sierra

5. El liquen plano muestra una asociación frecuente con una infección viral crónica que afecta principalmente al hígado. ¿Cuál es?

A) Citomegalovirus

B) Hepatitis B

C) Hepatitis C

D) Virus de Epstein-Barr

RESPUESTA:

C) Hepatitis C

6. ¿Cómo se denomina la variante clínica del liquen plano que se caracteriza por la formación de ampollas?

- A) Liquen atrófico
- B) Liquen folicular
- C) Liquen ampolloso
- D) Liquen obtuso

RESPUESTA:

C) Liquen ampoloso

7. En las formas habituales de liquen plano, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para aplicación local?

A) Retinoides orales

B) Antihistamínicos tópicos

C) Ciclosporina

D) Corticoides tópicos

RESPUESTA:

D) Corticoides tópicos

8. Las lesiones blanquecinas en la mucosa oral, con un patrón reticulado descrito como en "hojas de helecho", son un signo característico de:

- A) Candidiasis oral
- B) Liquen plano oral
- C) Leucoplasia
- D) Lupus eritematoso

RESPUESTA:

B) Liquen plano oral

9. En la histología del liquen plano, ¿qué son los cuerpos coloides de Civatte?

- A) Células presentadoras de antígeno
- B) Acúmulos de linfocitos
- C) Queratinocitos apoptóticos
- D) Espacios en la unión dermoepidérmica

RESPUESTA:

C) Queratinocitos apoptóticos

10. La descripción de lesiones anulares en "brocal de pozo" es típica del liquen plano en qué localización?

A) Pene

B) Tobillos

C) Cuero cabelludo

D) Mucosa oral

RESPUESTA:

A) Pene

11. ¿Cuál de los siguientes se considera un factor desencadenante fundamental en la aparición de brotes de liquen plano?

A) Consumo de lácteos

B) Estrés

C) Actividad física

D) Clima frío

RESPUESTA:

B) Estrés

12. ¿Cuál de las siguientes dermatosis liquenoides se caracteriza por múltiples pápulas muy pequeñas, del color de la piel, que aparecen en grandes grupos y no suelen picar?

A) Liquen nítido

B) Liquen escleroso y atrófico

C) Liquen simple crónico

D) Liquen estriado

RESPUESTA:

A) Liquen nítido

13. Las finas líneas blanquecinas en forma de red sobre la superficie de las pápulas de liquen plano se denominan:

- A) Descamación en collarete
- B) Punteado ungueal
- C) Telangiectasias
- D) Estrías de Wickham

RESPUESTA:

D) Estrías de Wickham

14. La variante de liquen plano que afecta a los folículos pilosos y puede conducir a una alopecia cicatricial permanente se conoce como:

- A) Liquen anular
- B) Liquen miliar
- C) Liquen folicular
- D) Liquen actínico

RESPUESTA:

C) Liquen folicular

15. En la histología del liquen plano, la destrucción de la capa basal epidérmica puede crear unos espacios o hendiduras característicos llamados:

A) Lagunas vasculares

B) Globos córneos

C) Cuerpos de Kamino

D) Despegamientos de Max Joseph

RESPUESTA:

D) Despegamientos de Max Joseph

16. ¿Cuál es la localización MÁS frecuente del liquen plano en la cavidad oral?

A) Labios (20%)

B) Yugal (80-90%)

C) Lengua (65%)

D) Encías (1%)

RESPUESTA:

B) Yugal (80-90%)

17. La afectación del cuero cabelludo por liquen plano (liquen plano pilar) debe diferenciarse de otra alopecia cicatricial idiopática denominada:

- A) Alopecia areata
- B) Síndrome de Gianotti-Crosti
- C) Efluvio telógeno
- D) Pseudopelada de Brocq

RESPUESTA:

D) Pseudopelada de Brocq

18. ¿Qué describe correctamente la enfermedad injerto contra huésped (EICH)?

- A) Una reacción alérgica a los fármacos inmunosupresores utilizados en un trasplante.
- B) Una reacción del sistema inmune del huésped que rechaza un órgano trasplantado.
- C) Una reacción de las células inmunitarias del donante que atacan los tejidos del receptor.
- D) Una infección oportunista que se desarrolla debido a la inmunosupresión post-trasplante.

RESPUESTA:

C) Una reacción de las células inmunitarias del donante que atacan los tejidos del receptor.

19. El liquen escleroso y atrófico se caracteriza clínicamente por:

- A) Vesículas agrupadas sobre una base eritematosa.
- B) Placas eritematosas con escamas plateadas.
- C) Pápulas violáceas muy pruriginosas.
- D) Una placa atrófica con aspecto porcelánico.

RESPUESTA:

D) Una placa atrófica con aspecto porcelánico.

20. La variante del liquen plano que aparece predominantemente en áreas expuestas al sol se denomina:

A) Liquen eritrodérmico

B) Liquen actínico

C) Liquen folicular

D) Liquen obtuso

RESPUESTA:

B) Liquen actínico

21. Para los casos graves de liquen plano que no responden a la terapia convencional, se pueden emplear fármacos como la Acitretina, que pertenecen al grupo de los:

A) Corticoides sistémicos

B) Retinoides

C) Antihistamínicos

D) Inmunosupresores

RESPUESTA:

B) Retinoides

22. El infiltrado inflamatorio que se observa en la biopsia de una lesión de liquen plano se describe típicamente como:

- A) Difuso en toda la dermis
- B) En banda linfo-histiocitario
- C) Nodular con eosinófilos
- D) Perivascular profundo

RESPUESTA:

B) En banda linfo-histiocitario

23. La afectación ungueal es una manifestación del liquen plano. ¿Cuál de los siguientes es un signo típico?

- A) Adelgazamiento y estrías longitudinales
- B) Mancha de aceite
- C) Engrosamiento y coloración amarilla
- D) Hemorragias en astilla

RESPUESTA:

A) Adelgazamiento y estrías longitudinales

24. Para confirmar un diagnóstico dudoso de liquen plano, el método más fiable es:

- A) Un examen con luz de Wood
- B) Una biopsia de la lesión
- C) Un test de parche
- D) Un análisis de sangre para VHC

RESPUESTA:

B) Una biopsia de la lesión

25. ¿Qué característica distingue a menudo una erupción liquenoide por medicamentos del liquen plano idiopático?

- A) Presentación más eczematosa o psoriasiforme
- B) Afectación exclusiva de las mucosas
- C) Ausencia total de prurito
- D) Presencia constante de estrías de Wickham

RESPUESTA:

A) Presentación más eczematosa o psoriasiforme

26. El nombre "liquen" fue acuñado debido a la semejanza morfológica de las lesiones con:

- A) Los líquenes que crecen sobre las rocas.
- B) Los corales del fondo marino.
- C) El musgo que crece en lugares húmedos.
- D) Las escamas de los reptiles.

RESPUESTA:

A) Los líquenes que crecen sobre las rocas.

27. Clínicamente, las estrías de Wickham se corresponden en la histología con un:

- A) Aumento del grosor de la capa córnea (hiperqueratosis)
- B) Acumulación de melanina en la dermis
- C) Edema en la dermis papilar
- D) Engrosamiento de la capa granulosa (hipergranulosis)

RESPUESTA:

D) Engrosamiento de la capa granulosa (hipergranulosis)

28. Además de ciertos medicamentos, los reveladores fotográficos pueden causar:

- A) Urticaria de contacto
- B) Reacciones liquenoides
- C) Vitíligo químico
- D) Psoriasis

RESPUESTA:

B) Reacciones liquenoides

29. Una característica general del liquen plano clásico es que, al resolverse, las lesiones:

- A) Suelen dejar cicatrices atróficas.
- B) Se transforman en verrugas.
- C) Siempre requieren tratamiento quirúrgico para eliminarse.
- D) No suelen dejar secuelas permanentes.

RESPUESTA:

D) No suelen dejar secuelas permanentes.